



Ifylles av läkare/barnmorska

Misslyckad insättning av hormonspiralen Levosertone. Ett nytt försök till insättning planeras.

Obrukbar Levosertone skall ej insändas. Klipp ut etiketten med batchnummer som finns på innerförpackningen, och fäst den på denna blanketts bak-sida och sänd den till Gedeon Richter Nordics AB.

Om etiketten med batchnummer saknas erhålls ej ersättningsspiral.

Denna blankett gäller ersättning av 1 st
Levosertone (Vnr 173537).

Ny Levosert sänds till förskrivaren utan kostnad.

Datum (för ej lyckad insättning): _____

Orsak: _____

Levosertone ersättningsblankett (rekvisition) kommer att vidaresändas till Meds apotek via fax, som är det öppenvårdsapotek som kommer att hantera rekvisitionen och distribuera ersättningsvaran.

Produktfel

I de fall misslyckad insättning anses bero på produktfel ska Levosert reklameras till apotek enligt sedvanligt reklamationsförfarande för läkemedel. Ny Levosertone erhålles då från apoteket.

Ofullständigt ifylld blankett kan fördröja leveransen

Läkarens/Barnmorskans namn: _____

Förskrivarkod (7-siffrig): _____

Ange om lunchstängt och ev. portkod (för bättre leveranssäkerhet): _____

Arbetsplats: _____

Leveransadress (OBS! Ej box-nr): _____

Postnummer (till leveransadressen): _____

Ort: _____

Tel: _____

Vänligen uppge telefonnummer där ni kan nås hela dagen.

E-post: _____

Datum/sign: _____

Vi på Gedeon Richter är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker. All behandling av personuppgifter sker enligt den nya dataskyddslagen och du har alltid en rätt att vända dig till Datatilsynsmyndigheten med klagomål om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med lag. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, läs mer i vår Integritetspolicy

Levosertone (levonorgestrel) 20 mikrogram/24 timmar intrauterint inlägg. Rx. EF. ATC-kod: G02BA03. Intrauterina preventivmedel, intrauterint inlägg av plast med gestagen. Indikation: Preventivmedel. Behandling av kraftiga menstruationsblödningar. Levosertone kan vara särskilt användbart för kvinnor med kraftiga menstruationsblödningar som kräver (reversibelt) preventivmedel. Kontraindikationer: konstaterad eller misstänkt graviditet, pågående eller recidiverande bäckeninflammation, infektion i yttre könsorgan, endometrit postpartum, infekterad abort under de tre sista månaderna, cervicit, cervixdysplasi, misstänkt eller bekräftad malignitet i uterus eller cervix, levertumör eller annan akut eller svår leversjukdom, medfödd eller förvärdad abnormitet i uterus inklusive fibrom om de deformerar uterus-kaviteten, odiagnostiserad blödning från uterus, tillstånd i samband med ökad mottaglighet för infektioner, aktuella eller misstänkta hormonberoende tumörer såsom bröstcancer, akuta maligniteter som påverkar blodet eller leukemier förutom om de är i remission, nylig trofoblastsjukdom med kvarstående förhöjda hCG-nivåer, överkänslighet. Varningar och försiktighet: Det rekommenderas starkt att Levosertone endast sätts in av läkare/sjukvårdspersonal som har erfarenhet och/eller har tillräcklig utbildning av insättningar av intrauterina inlägg med levonorgestrel. Innan insättning ska en fullständig medicinsk personlig anamnes och familjeanamnes tas. Puls och blodtryck bör mätas och en bimanuell bäckenundersökning bör utföras för att fastställa uterus position. Patienten bör undersökas igen sex veckor efter insättning och ytterligare undersökningar ska genomföras vid klinisk indikering och anpassas efter den enskilda kvinnans snarare än som en rutinåtgärd. Vid insättningssvårighet och/eller mycket stark smärta eller blödning under eller efter insättning, ska fysisk undersökning och ultraljudsundersökning utföras omedelbart för att utesluta perforering av uterus eller cervix. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling. Fertilitet, graviditet och amning: Levosertone är inte avsedd att användas under eller vid misstänkt graviditet. Vid oplanerad graviditet med Levosertone in situ, ska extrauterin graviditet uteslutas och inlägget ska avlägsnas och avbrytande av graviditeten ska övervägas eftersom hög risk för graviditetskomplikationer (abort, infektion och sepsis) föreligger. Användningen av intrauterint inlägg med levonorgestrel ändrar inte den kvinnliga fertilitetens förlopp efter avlägsnandet av det intrauterina inlägget. Levonorgestrel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk efter användning av intrauterint inlägg med levonorgestrel. Eftersom inga effekter på barnet förväntas kan amning fortsätta vid användning av Levosert. Biverkningar: Biverkningar är vanligare under de första månaderna efter insättandet men avtar under långvarig användning. Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 10 % av patienterna) omfattar uterus-/vaginalblödning inklusive stänklödning, oligomenorré, amenorré och benigna ovarialcystor, samt procedurall smärta och blödning. Förpackningar: 1 styck. För ytterligare information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén: 2021-06-29. Innehavare av godkännande för försäljning: Gedeon Richter Plc, Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Ungern. Information lämnas av: Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. Tel: 08- 611 24 00. Medicinsk information: medinfo.se@gedeonrichter.eu, tel: 08-506 394 76.

Gäller from 2023-01-01

LEV-JAN23-SV-23020:1