

وصف طبيبك Cyclogest® كجزء من علاج الخصوبة الخاص بك.

ستُشَدك هذه المعلومات إلى سبب وكيفية استخدام Cyclogest®.

ما هو Cyclogest®؟

Cyclogest® عبارة عن فرزجة (لبوس مهبلي) تحتوي على البروجسترون - وهو هرمون أنثوي طبيعي ينتجه جسمك، بشكل رئيسي في المبيضين.

Cyclogest® يوصف للنساء اللاتي يحتجن إلى المزيد من البروجسترون أثناء الخضوع للعلاج المساعد على الخصوبة.

بعد إعطاء Cyclogest® في المهبل، توفر فرازج Cyclogest® انتشارًا ثابتًا ومحددًا من البروجسترون في بطانة الرحم. بمجرد زرع الجنين عن طريق التلقيح الاصطناعي، يمكن أن يساعد البروجسترون في نموه وتطوره.

## كيفية استخدام Cyclogest®؟

استخدمي دائماً Cyclogest® وفقاً لتعليمات طبيبك أو ممرضتك.

٣

### دعي الفرزجة تعمل

بمجرد إدخالها، فإن Cyclogest® سوف تذوب الفرزجة ببطء و ينتشر تدريجياً هرمون البروجسترون الذي يتم امتصاصه بعد ذلك بواسطة بطانة الرحم حيث تكون هناك حاجة إليه. قد تواجهين بعض التسريب في المنتج بعد ذوبان فرزجة Cyclogest® ولكن تأكدي من أن هذا طبيعي تماماً للأدوية التي يتم إدخالها عن طريق المهبل. قد تستخدم بعض النساء الفوط اليومية للمساعدة في ذلك.

٢

### أدخلي Cyclogest®

للإدخال المهبلي، ضعي الفرزجة بين شفتي المهبل، وادفعي الفرزجة لأعلى. قد تجددين أنه من الأسهل القيام بذلك إذا كنت مستلقية أو جالسة.

١

### أخرجي Cyclogest® من العبوة.

بأيدي نظيفة، أزيلي فرزجة Cyclogest® من العبوة.



## كيف يتم تخزين Cyclogest®؟

لا تقومي بتخزين Cyclogest® في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

## إذا نسيت إدخال Cyclogest®

أوصالك طبيبك أو ممرضتك بموعد إدخال Cyclogest®. الجرعة الموصى بها هي مرتين يوميًا - في الصباح وعند النوم. إذا نسيت إدخال التحميلة، افعلي ذلك بمجرد أن تتذكرتي، إلا إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية . لا تستخدمي أبدًا جرعتين معًا للتعويض عن الجرعة المنسية. تذكرتي أن تستخدمني الجرعات المتبقية في الوقت الصحيح.

اقرأ النشرة المرفقة بالعبوة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو إذا كانت لديك أي آثار جانبية، فتحدثي إلى طبيبك، أو الصيدلي أو الممرضة.

### تحذيرات واحتياطات خاصة للاستخدام

أبدي عناية خاصة وأخبري طبيبك على الفور إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض أثناء العلاج أو حتى بعد أيام قليلة من الجرعة الأخيرة: الام في ربة الساق أو الصدر، ضيق مفاجئ في التنفس أو سعال مصحوب بخروج الدم، صداع شديد أو قيء، دوار، ضعف، أو تغيرات في الرؤية أو الكلام، ضعف أو تنميل في الذراع أو الساق، تقادم الاكثئاب. توخي الحذر أثناء القيادة أو استخدام الآلات لأن Cyclogest® قد يسبب الدوار.

معلومات طبية: البريد الإلكتروني: [medinfo.nordic@gedeonrichter.eu](mailto:medinfo.nordic@gedeonrichter.eu).



GEDeon RICHTER

23 111,022 Barnhusgatan ستوكهولم، السويد.