

Vad är Cyclogest®?

Cyclogest® är ett vagitorium som innehåller progesteron – ett naturligt kvinnligt könshormon som främst produceras i äggstockarna. Cyclogest® är avsett för kvinnor som behöver extra progesteron i samband med assisterad befruktning. Efter administration av Cyclogest® i vagina, frigörs progesteron lokalt, tas upp av livmoderslemhinnan och ökar din chans att bli gravid samt behålla graviditeten när du behandlas för ofrivillig barnlöshet.

Hur använder du Cyclogest®?

1

Ta ut Cyclogest® från förpackningen

Tvätta händerna noga och ta därefter ut Cyclogest® vagitoriet från förpackningen.

2

För in Cyclogest®

För att föra in Cyclogest® i slidan, håll vagitoriet mellan blygdläpparna och för in det uppåt och bakåt. Det kan underlätta att sitta på huk eller ligga ned.

3

Låt vagitoriet verka

Efter insättande av Cyclogest® smälter vagitoriet långsamt av kroppsvärmen och frigör gradvis progesteron som tas upp av livmoderslemhinnan. Då detta sker kan man uppleva flytningar men detta är helt normalt när läkemedel administreras i slidan. Använd gärna ett trosskydd för att skydda dina trosor.

Ta alltid Cyclogest® enligt anvisning från din läkare eller sköterska.



Hur förvaras Cyclogest®?

Förvara Cyclogest® vid högst 30°C.

Om du har glömt att ta Cyclogest®

Din läkare eller sköterska har instruerat dig när du ska ta Cyclogest®. Rekommenderad dos är två gånger dagligen – på morgonen och innan sänggående. Om du glömt att ta Cyclogest® – ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta Cyclogest®

Cyclogest (progesteron), 400 mg, vagitorium. Cyclogest är avsett för kvinnor som behöver extra progesteron under tiden de genomgår behandling i ett program för assisterad befruktning (ART). Progesteron verkar på livmoderslemhinnan och hjälper dig att bli gravid och behålla graviditeten när du behandlas för infertilitet (ofrivillig barnlöshet). **Varningar och försiktighet:** Var särskilt försiktig och tala omedelbart om för läkaren om du drabbas av något av dessa symtom under behandling eller några dagar efter sista dosen; smärtor i vaderna eller bröstkorgen, plötslig andfåddhet eller upphostning av blod, svår huvudvärk eller kräkningar, yrsel, matthet eller förändringar av syn eller tal, svaghet eller domning i en arm eller ett ben, förvärrade depressionssymtom. Cyclogest kan orsaka yrsel, därför bör fordonsförare och användare av maskiner vara försiktiga. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta Cyclogest. Den innehåller information som är viktig för dig. Om du har ytterligare frågor eller får biverkningar vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.**

Kontakt: Gedeon Richter Nordics, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. Telefon: 08-611 24 00. Medicinsk information: E-post: medinfo.se@gedeonrichter.eu. Telefon: 08-560 394 76. Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2020-04-03. För mer information se www.fass.se.



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.