

Bemfolapre pêûsa-derzî çawa tê bikaranîn



Ji we re Bemfola hat reçetekirin û ev rûpela
telîmatnameyê dê nîşanî we bide ka hûnê pêûsê
çawa bi kar bînin.

Bemfola 75 IU/0.125 ml

Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml

Bemfola 300 IU/0.50 ml

Bemfola 450 IU/0.75 ml

Solusyona derzîkirinê ya nav pêûsa-derzî.



bemfola
follitropin alfa

Tiştên ku


bên bîranîn:

Destên xwe bişon

Derziyê her roj heman saetê li xwe bidin

Pênûsa xwe 5–10 deqîqe beriya bikaranînê ji sarincê derxînin

Beşên cuda yên pênûsa we



E Derzî

F Qapaxa hundir a derziyê

G Qapaxa derve ya derziyê

A Dozaj

B Bişkovka dozajê

C Şîşika aktivasyonê

D Kartûşa bi îlac


Amadekirina derziya xwe

Etikete ji ser derziya enjeksiyone rakin.


Pênûsê bi kêlekên xwe ve girê bidin û derziyê bi niximandina pênûsê ve girê bidin.

Hişyarî: Di dema pêvedana derziyê da, destikê dosajê neavêje hundir.

Pozîsyona rast a derziyê





Pozîsyona nerast ya derziyê



Qapaxa derve ya derziyê derxin. Wê ji bo careke din veşêrin.

Piştî derzîkirinê ew ê ji we re lazim bike.


Qapaxa hundir a derziyê derxin.



Pênûsê wisa bigirin ku berê derziya wê bikeve jor.¹


Bişkovka dozajê pal bidin ta ku disekine.

Şişika aktîvasyonê winda dibe û divê hinek lîkîd jê bavêje derve – ev normal e.² Eger lîkîd jê neavêje derve, pênûsê bi kar neynin, yeke nû hilgirin.



Eyarkirina dozê

Bişkovka dozajê bizivîrinin ta ku doza ji we re hatiye rêçetekirin were ser xeta ekranê. Pênûs niha amade ye ji bo derzîkirinê.



Derzîkirina li xwe

Zûka lîkîdê (wek edetî nav zîkê xwe) li gor telîmatên bijîşk an jî hemşîreya xwe derzî bikin. Bi awayekî nerm çermê li cihê derzîkirinê bigivêşin û derziyê tê re bikin.



Hişyarî! Gava ku hûn derziyê dixinê bişkovka dozajê pal nedin!

Bişkovka dozajê hêdîka û domdar paldin ta ku ew disekine û şişika dozê winda dibe.


Derziyê zûka dernexînin. Beriya derxistinê 5 saniyan bisekinin.

Piştî derzîkirinê: Qapaxa derve ya derziyê biguherin û derziya bikarhatî bixin nav tişteke girtî (wek şûşe an jî qotiya şîr) û wê bavêjin nav zibilên malê.

Ekîpmanên mayî yên bikarhatî jî bavêjin nav zibilên malê.



Nav sarincê veşêrin (2°C – 8°C). Nekin cemed. Ji bo 90 rojan dikare ji sarincê bê derxistin û di germahiya odê de bê veşartin (zêdetirîn 25°C).



Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

Agahiyên zêdetir derbarê vê ilacê li vê navnişanê peyde dibe <http://www.ema.europa.eu>

Agahiyên zêdetir ên nişandari li vê navnişanê peyde dibin www.youtube.com

Ji bo welatên Bakurî jî, agahiyên zêdetir ên berhemê li vê navnişanê peyde dibin:

– Swêd: www.fass.se

– Finland: www.laakeinfo.fi

– Danimarka: www.ema.europa.eu

– Norwêc: www.felleskatalogen.no

Peywirdarê Karê Bazarkirinê û Hilberîner:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Búdapeşt

Macaristan