



ما هو دواء Ganirelix Gedeon Richter ولماذا يُستعمل؟

يُستعمل دواء Ganirelix Gedeon Richter للوقاية من الارتفاع المبكر للهرمون المُلوّن الذي قد يسبب إباضة مبكرة لدى النساء اللواتي يخضعن للتلقيح بالمساعدة.

يجب حقن دواء Ganirelix Gedeon Richter، المعباً مسبقاً بحقنة مزودة بابرة ثابتة، في الطبقة الدهنية تحت الجلد مباشرةً، وذلك حسب إرشادات الطبيب أو الممرضة. لا تخلطي محتوى حقنة Ganirelix Gedeon Richter مع أي دواء آخر. خذى الحقنة في ذات الوقت الذي تأخذين فيه الهرمون المحفز للحربيات المبيضية.

طريقة استعمال دواء Ganirelix Gedeon Richter

خذى دائمًا دواء Ganirelix Gedeon Richter
وفقاً لتعليمات الطبيب أو الممرضة.

2

احقني الحرعة

أمسكى الجلد وأدخلى الإبرة في طية الجلد. اضغطى برفق وثبات على المكبس، وواصلي الضغط إلى أن يتم تفريغ الحقنة. انتظري خمس ثوانٍ، ثم اتركي الجلد واسحبى الإبرة.




لا تعىدي تغطية الإبرة بالغطاء، وذلك لتفادي الإصابات الناتجة عن الوخز. تخلصي فوراً من الحقنة المستعملة في حاوية مقاومة للوحز (اطلبى علبة مخصصة للإبر من الصيدلية) وأعidiها إلى الصيدلية للتخلص منها بطريقه آمنة. أسأل موظفي الصيدلية عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تُستعمل.

1

حضرى الحقنة

اقرأى النشرة المرفقة بدقة. اغسلى يديك واحرجي الحقنة المعباً مسبقاً من العلبة. أمسكى الحقنة من المنتصف. تأكدى من أن السائل في الحقنة نقى وخالٍ من الشوائب. قد تكون هناك فقاعات صغيرة مرئية، ولكن لا حاجة لإزالتها. امسكى الحقنة بشكل أفقى، بحيث تكون الإبرة موجهة بعيداً عنك، ثم انزعى غطاء الإبرة. ملاحظة: لا تلقي غطاء الإبرة عند نزعه.





اقرأى النشرة المُرفقة بدقة قبل البدء باستعمال دواء Ganirelix Gedeon Richter

معلومات مهمة حول المنتج. للحصول على كامل المعلومات، يُرجى قراءة النشرة المُرفقة.

معيناً مسقاً في فمه. يُستعمل Ganirelix Gedeon Richter محلول للحقن 0.25 مل، ملليلتر، سائل للهرمون المثليون الذي قد يسبب اضطراباً ميكراً لدى النساء التي يخضعن للتحفيظ بالمساعدة. **التحذيرات والاحتياطات:** لا تستعمل Ganirelix Gedeon Richter إن كانت لديك حساسية من الغانيريلاكس أو مادة أخرى موجودة في هذا الدواء. يجب عليك التوقف عن استعمال Ganirelix Gedeon Richter وطلب الرعاية الطبية فوراً إذا كنت تعاني من حالة تحسسية نشطة، أو إن أصبحت برة فعل تحسسية من الدواء. يجب تحبّت استعمال الدواء إن كان لديك حساسية مفرطة من الهرمون المطلق لموكبته الفردية التناسلية (GnRH) أو نظائره، أو إن كان لديك قصوراً متواتراً أو شديداً في وظائف الكلى أو الكبد. يجب عدم استعمال دواء Ganirelix Gedeon Richter إن كنت حامل أو مرضعة. إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هو ردة فعل حادة موضعية في مكان الحقن. أما الآثار الجانبية الأقل شيوعاً فهي صداع وغثيان وتوعك. اقرأ النشرة المرفقة بدقة قبل البدء باستعمال دواء Ganirelix Gedeon Richter. فهي تحذى على معلومات مهمة لك. أسائل الطبيب أو الممرضة إن كانت لديك أسئلة أخرى، واتبعي دائماً تعليماتهم. للمرزيد من المعلومات، اطلع على الشارة المرفقة و www.fass.se. الاتصال: +468-6112400. **المعلومات الطبية:** Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. هاتف: +468-6112422. إن المعلومات المختصرة مستندة إلى النشرة المرفقة المؤرخة في 15-07-2022.

طريقة حفظ دواء Ganirelix Gedeon Richter

يجب عدم حفظه في المحمدة. يُحفظ في علبة الأصلية بدرجة حرارة الغرفة. إن الدواء حساس للضوء.

إن نسيتِ أخذ دواء Ganirelix Gedeon Richter

إن نسيتِ أخذ حرقة، فخذيها في أقرب وقت ممكن. لا تأخذ حرعتين لتعويض الحرقة التي فاتتك. اتصل بالطبيب أو الممرضة إن كنت غير متأكدة.