

¿Qué es Ganirelix Gedeon Richter y para qué se utiliza?

Ganirelix Gedeon Richter se usa para prevenir el aumento precoz de la LH, que puede causar una ovulación prematura en mujeres sometidas a fecundación asistida.

La jeringa precargada con aguja fija de Ganirelix Gedeon Richter debe inyectarse en la capa de grasa situada justo debajo de la piel, según la prescripción de su médico o enfermero. No combine Ganirelix Gedeon Richter con otros medicamentos. Adminístrese la inyección a la misma hora que toma su hormona estimulante de los folículos ováricos.




Cómo utilizar Ganirelix Gedeon Richter

Tome siempre Ganirelix Gedeon Richter según las indicaciones de su médico o enfermero.

Preparación de la inyección

Lea atentamente el prospecto. Lávese las manos y saque una jeringa precargada del envase. Sujete la jeringa por la parte central. Compruebe que la solución de la jeringa sea transparente y no contenga partículas. Pueden apreciarse pequeñas burbujas de aire, pero no es necesario eliminarlas. Sujete la jeringa en posición horizontal con la aguja apuntando hacia afuera y retire el protector de la aguja.
Nota: ¡No gire el protector de la aguja!

1



Inyección de la dosis

Agarre la piel con los dedos e inserte la aguja en el pliegue cutáneo. Presione el émbolo con cuidado pero firmemente hasta vaciar la jeringa. Espere 5 segundos, suelte a continuación el pliegue cutáneo y extraiga la aguja.

2



No coloque el protector de la aguja para evitar pinchazos accidentales.

Tras su uso, deseche la jeringa de inmediato en un contenedor seguro para agujas (solicite en su farmacia un bote específico) y devuélvala a la farmacia para su correcto descarte. Consulte con el personal de la farmacia sobre la forma de desechar los medicamentos que no vayan a utilizarse.



¿Cómo se debe guardar Ganirelix Gedeon Richter?

No congelar.

Guardar a temperatura ambiente en su envase original.

Sensible a la luz.

Si se olvida de usar Ganirelix Gedeon Richter

Si olvida una dosis, tómela cuanto antes.

No duplique la dosis para compensar la olvidada.

Consulte con su médico o enfermero si tiene alguna duda.

**Lea atentamente el prospecto
antes de empezar a tomar
Ganirelix Gedeon Richter**

Información importante sobre el producto. Para una información completa, consulte el prospecto.

Ganirelix Gedeon Richter (ganirelix), 0,25 mg/0,5 ml, solución inyectable en jeringa precargada. Ganirelix Gedeon Richter se usa para prevenir el aumento precoz de la hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés), que puede causar una ovulación prematura en mujeres sometidas a fecundación asistida.

Advertencias y precauciones: No use Ganirelix Gedeon Richter si es alérgico al ganirelix u otro componente de este medicamento. Si padece un cuadro alérgico activo o experimenta una reacción alérgica al medicamento, deje de utilizar Ganirelix Gedeon Richter y solicite asistencia médica de inmediato. Evite este medicamento si es hipersensible a la GnRH o a sus análogos, o si padece insuficiencia renal o hepática de grado moderado o grave. Si está embarazada o en período de lactancia, no utilice Ganirelix Gedeon Richter. El efecto secundario más frecuente son las reacciones cutáneas locales en el punto de inyección. Otros efectos secundarios menos frecuentes son dolor de cabeza, náuseas y malestar general. **Lea atentamente el prospecto antes de empezar a tomar Ganirelix Gedeon Richter.** Contiene información de importancia para usted. Consulte a su médico o enfermero si tiene más dudas y siga siempre sus instrucciones. Para información adicional, vea el prospecto y www.fass.se. **Contacto:** Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, SE-111 23 Estocolmo (Suecia). Tel.: +46 8 6112400. **Información médica:** medinfo.se@gedonrichter.eu, tel.: +46 8 6112422. Información resumida basada en el prospecto con fecha 15/7/2022.



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, SE-111 23 Estocolmo (Suecia).

ganirelix
GEDEON RICHTER
0,25 mg/0,5 ml
solución inyectable
en jeringa precargada