

Co to jest lek Ganirelix Gedeon Richter i w jakim celu się go stosuje?

Ganirelix Gedeon Richter stosuje się w celu zapobiegania przedwczesnemu wzrostowi poziomu hormonu LH, który może powodować przedwczesną owulację u kobiet poddających się zabiegom wspomaganego rozrodu.

Postać leku: ampułko-strzykawki z na stałe zamocowaną igłą, napełnione lekiem Ganirelix Gedeon Richter. Zawartość ampułko-strzykawki należy wstrzyknąć w warstwę tłuszczu bezpośrednio pod skórą, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki. Nie należy mieszać preparatu Ganirelix Gedeon Richter z innymi lekami.

Zastrzyk należy wykonywać o tej samej porze, o której przyjmuje się hormon stymulujący pęcherzyk jajnikowy.




Jak stosować lek Ganirelix Gedeon Richter

Lek Ganirelix Gedeon Richter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Przygotowanie zastrzyku

1

Uważnie zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Umyj ręce i wyjmij napełnioną ampułko-strzykawkę z opakowania. Trzymaj ampułko-strzykawkę pośrodku. Sprawdź, czy roztwór w ampułko-strzykawce jest klarowny i wolny od cząstek stałych. Małych pęcherzyków powietrza, które mogą być widoczne, nie trzeba usuwać. Trzymaj ampułko-strzykawkę w pozycji poziomej, z igłą skierowaną od siebie, i zdejmij osłonkę igły. Uwaga: nie należy obracać osłonki igły!



Wstrzykiwanie dawki

2

Chwyć palcami skórę i wprowadź igłę w fałd skórny. Delikatnie i równomiernie naciskaj tłok ampułko-strzykawki, aż do jej całkowitego opróżnienia. Odczekaj 5 sekund, a następnie zwolnij fałd skóry i wyciągnij igłę.



Nie zakładaj osłony igły, aby uniknąć zranienia. Zużyte ampułko-strzykawki należy wyrzucać bezpośrednio do odpornego na przekłucie pojemnika na igły (poprosz o taki pojemnik na igły w aptece) i zwrócić do apteki w celu właściwej utylizacji. Zapytaj personel apteki, co zrobić z lekami, których się już nie używa.



Jak przechowywać lek Ganirelix Gedeon Richter?

Leku nie wolno zamrażać.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu. Lek jest wrażliwy na działanie światła.

Pominięcie przyjęcia leku Ganirelix Gedeon Richter

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ganirelix Gedeon Richter należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Ważne informacje o produkcie. Pełne informacje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Ganirelix Gedeon Richter (ganirelix), 0,25 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Ganirelix Gedeon Richter stosuje się w celu zapobiegania przedwczesnemu wzrostowi poziomu hormonu luteinizującego, który może powodować przedwczesną owulację u kobiet poddających się zabiegom wspomaganego rozrodu. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie należy stosować leku Ganirelix Gedeon Richter w przypadku uczulenia na ganirelix lub jakiegokolwiek innego składnika tego leku. Jeśli masz aktywną alergię lub wystąpiła u Ciebie alergiczna reakcja na lek, należy zaprzestać stosowania leku Ganirelix Gedeon Richter i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Należy unikać stosowania niniejszego leku w przypadku nadwrażliwości na GnRH lub analogi GnRH, a także w przypadku umiarkowanego lub ciężkiego upośledzenia czynności nerek lub wątroby. Leku Ganirelix Gedeon Richter nie należy stosować w trakcie ciąży lub w okresie karmienia piersią. Najczęstszym działaniem niepożądanym są miejscowe reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia. Mniej częste działania niepożądane to bóle głowy, nudności i ogólne złe samopoczucie. **Przed rozpoczęciem stosowania leku Ganirelix Gedeon Richter należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zawiera ona ważne dla Ciebie informacje. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką i zawsze postępować zgodnie z ich zaleceniami.** Więcej informacji można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania i w witrynie www.fass.se. **Kontakt:** Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, SE-111 23 Sztokholm, Szwecja. Tel: +46-8-611 24 00. **Informacje medyczne:** medinfo.se@gedeonrichter.eu. Tel: +46-8-611 24 22. Skrócona informacja oparta na ulotce dołączonej do opakowania z dnia 15.07.2022 r.



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, SE-111 23 Sztokholm, Szwecja.

